



Pourquoi traiter les chiots contre les vers.....

- 🐛 Les chiots et les chiens adultes sont souvent atteints d'une infection due aux ascarides. Les vers peuvent rendre les chiots gravement malades!
- 🐛 Les ascarides peuvent également être transmis à l'homme.
- 🐛 Les chiots peuvent être infectés par les ascarides même avant la naissance dans le ventre de la mère ou via le lait maternel, ainsi même avant qu'un diagnostic par examen des selles soit vraiment possible.
- 🐛 Les chiots doivent être traités avec une préparation appropriée **dès l'âge de 2 semaines**. Ensuite le traitement est répété **toutes les 2 semaines** ou selon les instructions du producteur de la préparation jusqu'à la remise des chiots.
- 🐛 Les chiennes allaitantes doivent être traitées en même temps que le premier traitement de leurs chiots, car elles peuvent développer des infections en même temps que leurs chiots.
- 🐛 Aucune préparation n'empêche les chiots d'être infectés par les larves de vers déjà avant la naissance!



Les préparations disponibles momentanément en Suisse pour le traitement des vers chez les chiots:

Monopréparations (sous forme de pâte):

Flubenol KH (Flubendazol): sur deux jours consécutifs

Panacur Petpaste (Fenbendazol): sur trois jours consécutifs

Préparations combinées (sous forme de comprimés):

Caniquantel /Drontal Plus/Zantel (Praziquantel/Fenbendazol)

Dolpac (Oxantel/Praziquantel/Pyrantel)

Milbemax/Milpro (Milbemycinoxim/Praziquantel)

Source: TAK

Un traitement des chiots de moins de 4 semaines avec la substance active Praziquantel n'a pas de sens, car une infection par ténias, en règle générale, n'existe pas encore à cet âge.

Le dosage et l'application des préparations combinées sous forme de comprimés sont en partie difficiles pour les chiots Border Collies.